STYX
TATTOO/PIERCING STUDIO

PÉČE O PIERCING

Žádáme vás, abyste si pozorně přečetli následující upozornění a ve vlastním zájmu se jimi řídili. Samozřejmě platí, že žádný z uvedených postupů není definitivní, a pokud vám nebude vyhovovat, vyzkoušejte jiný. Pokud se vyskytnou alergické reakce (jako je zarudnutí dané oblasti, svědění či podráždění), zvolte jiný způsob péče o váš piercing. V případě silné alergické reakce či vážnějších zdravotních obtíží doporučujeme spojit se s lékařem.

JAKÁ JE NORMÁLNÍ REAKCE ORGANISMU NA PIERCING?

- pokožka v místě vpichu může být zarudlá, citlivá na dotek, bolet nebo svědit
- v prvních dnech může docházet k lehkému krvácení, zejména u piercingu pohlavních orgánů
- v místě vpichu a na šperku se může usazovat bělavý nebo nažloutlý výtok (není to hnis)
- okolní tkáň se rovněž může v průběhu hojení ke šperku pevně přimknout, což znesnadňuje manipulaci se šperkem za sucha

JAK SE O PIERCING STARAT?

Během počáteční fáze hojení je vpich vystaven infekci a nečistotám z okolí – je tudíž nezbytné ho čistit. Nezapomeňte, že piercing se vzhledem ke své podstatě nehojí jako jiná zranění.

ČÍM ČISTIT ČERSTVÝ PIERCING:

- slaná voda – je spolehlivým a zároveň neagresivním dezinfekčním prostředkem. Nejlepší poměr je jedna plná čajová lžička mořské soli na 200 ml teplé vody
- antibakteriální mýdla – na našem trhu jsou dostupná antibakteriální mýdla PROTEX a DETOL.
- čajovníkový olej (tea tree oil) – je nejsilnější známé přírodní antiseptikum. Má silnou schopnost pronikat do poškozených tkání a jeho účinnost se zvyšuje v přítomnosti krve a hnisu. Nicméně na něj nemálo lidí reaguje alergicky – nikdy by se neměl používat nezředěný.

ČÍM BYSTE PIERCING ČISTIT NEMĚLI:

- izopropylalkohol – velmi vysušuje pokožku
- peroxid vodíku – nikdy nepoužívejte na čerstvý piercing (s výjimkou piercingu jazyka). Peroxid ničí nově vytvořenou buněčnou tkáň
- neředěný čajovníkový olej – může vyvolat nepříjemné podráždění a vysušovat

JAK BYSTE MĚLI PIERCING ČISTIT?

Zapamatujte si, prosím, že hlavní příčinou infekcí piercingu je, když se člověk dotýká piercingu nemytýma rukama. Následující postup byste měli provádět dvakrát denně do té doby, dokud nedojde k úplnému zhojení piercingu:

- důkladně si umyjte ruce mýdlem a vodou, osušte je. Teprve potom byste se měli dotýkat piercingu
- na piercing naneste odpovídající množství teplé slané vody tak, aby pronikla až do vpichu a mohla rozpouštět zaschlý výtok. Nechte působit 30 vteřin až 1 minutu. Šperkem nepohybujte dříve, než voda tento výtok rozpustí – mohlo by to vést k podráždění či natržení vpichu a k následné infekci. Nechte slanou vodu vtéci do rány, vytáhne případný hnis a zároveň dezinfikuje. Několikrát šperk protočte.
- pokud se rozhodnete použít antibakteriální mýdlo, naneste na piercing jeho pěnu a nechte působit asi 1 minutu, ne déle. Důkladně piercing omyjte a přitom šperk protočte – v ráně nesmí nic zůstat.
- piercing opatrně osušte – v žádném případě ho nedrhněte ručníkem.

NA CO BYSTE SI MĚLI DÁT POZOR?

- Nedoporučujeme vám koupání ve veřejných bazénech, rybnících či společných vanách – je zde velký výskyt bakterií.
- Prvních několik týdnů po provedení piercingu jej nevystavujte přímému působení slunečních paprsků či solárií. Pokud se opalujete, nalepte přes piercing náplast.
- Snažte se vyhýbat nárazům, tlaku a nešetrné manipulaci s piercingem (např. při sportu, sexu apod.). Nečistěte piercing častěji, než jsme vám doporučili – je to spíš ke škodě než k užitku.
- Kosmetické přípravky – krémy, pudr, líčidla, parfémy, spreje, šampóny, lubrikační gely mohou piercing podráždit.
- Během procesu hojení se vyhýbejte kontaktu piercingu se slinami či potem (v zásadě s jakýmikoli tělesnými tekutinami) vašimi či cizích osob.
- V případě piercingu pohlavních orgánů se vyhýbejte nechráněnému pohlavnímu styku. Vystavujete se riziku infekce a přenosu pohlavních chorob včetně HIV.
- Nedoporučujeme používat na praní prádla, které přichází do styku s piercingem, prací prostředky obsahující enzymy. Enzymy mohou napadat buňky nové tkáně a zpomalovat proces hojení.
- Během procesu hojení byste šperk neměli vyjímat ani měnit, jelikož rána ještě není zhojená a mohlo by dojít k jejímu uzavření. V žádném případě nevyndávejte šperk tehdy, je-li v ráně infekce – mohlo by dojít k vytvoření abscesu a k následné sepsi, která je smrtelně nebezpečná. Chirurgická ocel, z níž je šperk vyroben, prakticky nevyvolává alergické reakce a lidský organismus ji snáší lépe než stříbro či zlato, které mají tendenci oxidovat.

INFEKCE – PŘÍČINY, PŘÍZNAKY A LÉČENÍ

INFEKCE MÁ NEJČASTĚJI TYTO PŘÍČINY:

- sahání na čerstvý vpich a šperk nemytýma rukama
- kontakt s tělesnými tekutinami vašimi či někoho jiného
- koupání se ve znečištěné vodě
- kontakt s nepraným oblečením či ložním prádlem

INFEKCE SE PROJEVUJE TAKTO:

- nadměrný otok a zarudnutí vpichu
- pocit horka okolo vpichu
- bodavá nebo řezavá bolest v oblasti vpichu piercingu
- výtok nažloutlého, nazelenalého či šedavého hnisu

JAK INFEKCI LÉČIT:

- v žádném případě šperk neodstraňujte
- aplikujte Bactroban nebo jiný odpovídající lék
- Jestliže potíže ani po týdnu neustoupí, spojte se se svým lékařem. Obklady z horké slané vody pomohou hnis vytáhnout a zároveň dezinfikují. Antibiotikum, jako je Bactroban, je možno používat maximálně 10 dní a pouze v malém množství. Jestliže z piercingu vytéká nazelenalý hnis, jedná se o vážnou infekci. V takovémto případě doporučujeme neprodleně se spojit s vaším lékařem.

NEJČASTĚJŠÍ KOMPLIKACE

Vypuzení šperku nebo jeho posunutí patří mezi nejběžnější problémy spojené s piercingem. Vypuzení může být způsobeno infekcí, neopatrnou manipulací se šperkem, alergií na kov, neodpovídající velikostí či tvarem šperku či jeho špatným umístěním. Přemístění či vypuzení šperku se projevuje tím, že se šířka vpichu zmenšuje. V některých případech mělkých vpichů, například u piercingu obočí, bude šperk vidět pod kůží. Na místě vpichu se utvoří strup. V této fázi je lépe šperk vyjmout, aby se předešlo vytvoření jizevní tkáně. Vypuzený šperk je možno znovu umístit teprve tehdy, jestliže došlo k dostatečnému zhojení tkáně. Nicméně vpich za jizevní tkáň původního vpichu nezaručuje, že se druhý pokus zdaří. Keloidní jizvy vypadají jako malý zarudlý hrbolek na piercingu. Jedná se o nadbytečné tvoření jizevní tkáně, způsobené zpravidla neopatrnou manipulací s piercingem nebo jeho chemickým podrážděním. Na vině rovněž může být nevhodný tvar či velikost šperku či jeho umístění. Folikulární cysty mají sice vědecky znějící název, ale většinou jde jenom o přítomnost cizího předmětu (např. chloupku) uvnitř piercingu. Postižené místo může zarudnout, být citlivé na dotek, někdy dochází i ke krvácení. S folikulárními cystami a keloidními jizvami se vypořádáte výměnou šperku (tj. kontaktujte piercingové studio), obklady horkou slanou vodou a aplikací Bactrobanu. Pomoci rovněž může aplikace vitamínu E (ve formě kapek na postižené místo).

JAK URYCHLIT HOJENÍ?

- hojení neurychlíte tím, že budete váš piercing čistit častěji, než je doporučeno. Spíš naopak
- užívání vitamínů skupiny B, vitamínů C a E, multivitamínových přípravků a zinku má příznivý vliv na hojení a regeneraci tkáně
- na piercing rovněž můžete aplikovat vitamín E (je k dostání jako kapky nebo stačí vymáčknout trochu olejíčku ze želatinové kapsle, v níž se vitamín E běžně prodává)

JAK DLOUHO SE BUDE PIERCING HOJIT?

Pupík – 6 měsíců až 2 roky
Ret – 6 až 8 týdnů
Jazyk – 4 až 6 týdnů
Tvář, obočí – 2 až 3 měsíce
Klitoris, malé stydké pysky, Prince Albert – 4 až 8 týdnů
Bradavky, vnější stydké pysky, šourek – 2 až 6 měsíců
Ampallang, apadravya – 4 až 8 měsíců

STYX
TATTOO/PIERCING STUDIO
603 953 777
TATTOO@BORIS-STYX.CZ
WWW.BORIS-STYX.CZ
TATTOO STYX
OSTRAVA